

皮，陰核龜頭也有包皮，只是陰核龜頭的包皮和體壁皮膚相連，綁住整條陰核，使得整條陰核不能像陰莖一樣自由搖擺。陰莖由二大條海綿體合併組成，左右各一條，相互對稱；二條海綿體露出體外的部分稱為陰莖，貼在身體體壁的部分稱為陰莖腳，故一條陰莖有左右二隻腳，彼此對稱；藏在身體體壁的陰莖腳比露在外面的陰莖長很多。陰核則是由二小小條海綿體合組而成，也是左右各一條，每條也都有腳，構成左陰核腳和右陰核腳，二條陰核腳也比陰核體長很多，二隻陰核腳也是左右對稱。

前教育部長吳京強調常態分班，常態指的是有少數學生學習能力特別差，有少數學生特別好，其餘大多數學生則介於這二個極端之間，即非很聰明，也不是很笨。世間事世間物也是這樣，故稱為常態。

女性陰核和男性陰莖的尺寸也呈常態分佈，少數人很小很短，另外少數人很大很長，大多數人則是不大不小不長不短。長者並非一定粗大，短者並非一定細小，長而細或短而粗者大有人在。陰莖陰核的尺寸大小和身高或長相無關，也和性觸感品質無關。

對自己的陰核擁有豐富知識的女性應該不多，這種專業知識要靠專家學者來研究。人類最早研究女性陰核尺寸的學者是美國人狄金森氏 (Dickinson)。一九四五年，他研究了一百位洋女性的陰核尺寸，以陰核龜頭左右和上下直徑計量其大小。將陰核龜頭包皮翻開後，裸露的陰核龜頭大者狀似一顆直立的花生米，小者像一顆直立的米粒，都是上下直徑較長，左右直徑較短。

研究發現，女性陰核頭的尺寸也呈常態分佈，一百人中有五人 (五%) 陰核頭細小，左右或上下直徑○·二公分以下 (含)；有二十人 (二十%) 陰核頭粗大，直徑○·六公分以上 (含)；