

劑，掀起男人的欣快感和性快感，但往往興奮過頭，騎虎難下，有經驗的人會在此時靜脈注射一針海洛因，海洛因是中樞神經抑制劑，不但能結束興奮狀態，更能在大腦裡產生高潮的銷魂快感。

海洛因有耐藥性，有生理依賴，有成癮性，但這些都不是海洛因對男人的最大傷害，海洛因對男人的最大傷害是，男人從開始使用海洛因銷魂起，他的性生活和性機能即開始迅速下滑，不多久就陽痿了，每日清晨陰莖自然勃起的機能也不見了，停藥後陽痿仍在，性機能無法復原。安非他命和古柯鹼雖能增強陰莖的勃起機能，但長期使用後性機能反而轉弱。

海洛因斷藥後會有斷藥症狀出現，但這些症狀很少危及生命，斷藥六至十二小時後症狀開始出現，症狀有流淚、流汗、流鼻水和呻吟等；斷藥後二十小時，人開始顫抖，瞳孔放大，情緒激憤；二至三日後症狀最爲嚴重，有虛弱、失眠、惡寒、腸絞痛、嘔吐、下瀉、小腿肌痛、腰背痛、高血壓、頻脈、大量出汗、陣陣雞皮疙瘩等症狀；人可因脫水過多、心臟喪失功能而死亡；整個斷藥症狀持續五至十日。

海洛因持續用藥而劑量也控制得宜時，不但不會有斷藥症狀出現，大腦似也不至受損。美國有位八十四歲老醫師，連續使用嗎啡長達六十二年，心智和身體都未見損傷。使用海洛因已成癮者，只要劑量小心控制，工作和家居生活似也未受影響。海洛因供應中斷後，成癮者爲了取得毒品，有可能訴諸暴力劫財購買海洛因解癮。

使用未經消毒的針頭和針筒靜脈注射海洛因，會產生二十種以上疾病，包括愛滋病、病毒性肝炎、各種肝病、內心膜炎、腎臟病、肺炎、肺腫瘍、肺結核、肺纖維化、骨膜炎