

<p>血鉀 (mEq/L) (K)</p> <p>陰陽調和區：3.5-5.0</p> <p>低血鉀：低於3.5</p> <p>高血鉀：高於5.0</p>	<p>* 血鉀低於2.5-3.0單位時，有多尿、口渴、虛弱、肌痛等症狀。低於2.0單位時，四肢肌肉會癱瘓，不能行動，心臟會開始亂跳（不整律）。低血鉀還會使人頭腦不清、昏昏欲睡、疲勞等，也傷害腎功能。</p> <p>* 高血鉀也會使四肢無力，血鉀上升到6.8單位時，四肢開始癱瘓。血鉀超過5.9單位時，就會搗亂心臟電路，超過8.0單位時，可使心臟停止跳動而致命。</p>
<p>動脈血液酸鹼度 (pH)</p> <p>陰陽調和區：7.36-7.44</p> <p>酸中毒：低於7.36</p> <p>鹼中毒：高於7.44</p>	<p>* 酸中毒時，有呼吸困難、頭痛、頭腦不清、心跳變快、心亂跳、臉紅等症狀。</p> <p>* 鹼中毒時，有頭暈、頭腦不清、心跳變快等症狀。</p> <p>* 酸度低於6.8（極度酸中毒），或鹼度高於7.7（極度鹼中毒）時，生命就無法生存。嚴重酸中毒或鹼中毒，都會讓人昏迷而死。</p>